

Gatunki stwierdzone na terenie użytku ekologicznego „Darzybór”

FLORA

Gatunki rzadkie, zagrożone, prawnie chronione:

bukwica zwyczajna (*Betonica officinalis*), goździk kartuzek (*Dianthus carthusianorum*), groszek błotny (*Lathyrus palustris*), klon polny (*Acer campestre*), kocanki piaskowe (*Helichrysum arenarium*), konwalia majowa (*Convallaria majalis*), kopytnik pospolity (*Asarum europaeum*), kruszyna pospolita (*Frangula alnus*), nasięźrzał pospolity (*Ophioglossum vulgatum*), porzeczka czarna (*Ribes nigrum*), szczaw gajowy (*Rumex sanguineus*), włosienicznik wodny (*Batrachium aquatile*)

Gatunki wskaźnikowe dla ważniejszych siedlisk przyrodniczych*:

[1] rzęsa drobna (*Lemna minor*), rzęśl długoszyjkowa (*Callitriche cophocarpa*);

[2] gwiazdnica błotna (*Stellaria palustris*), przetacznik błotny (*Veronica scutellata*), turzyca pospolita (*Carex nigra*), turzyca prosowata (*Carex panicea*);

[3] babka wielonasienna (*Plantago intermedia*), rdest ostrogorzki (*Polygonum hydropiper*), szarota błotna (*Gnaphalium uliginosum*), uczepek trójlistkowy (*Bidens tripartita*);

[4] ponikło błotne (*Eleocharis palustris*), przetacznik bobownik (*Veronica anagallis-aquatica*), przytulia błotna (*Galium palustre*), tarczycza pospolita (*Scutellaria galericulata*);

[5] dzięgiel leśny (*Angelica sylvestris*), dziurawiec skrzydełkowany (*Hypericum tetrapterum*), firletka poszarpana (*Lychnis flos-cuculi*), groszek łąkowy (*Lathyrus pratensis*), kniec błotna (*Caltha palustris*), krwiściąg lekarski (*Sanguisorba officinalis*), ostrożeń błotny (*Cirsium palustre*), ostrożeń warzywny (*Cirsium oleraceum*), pępawa błotna (*Crepis paludosa*), przetacznik ożankowy (*Veronica chamaedrys*), rajgras wyniosły (*Arrhenatherum elatius*), rdest wężownik (*Polygonum bistorta*), sitowie leśne (*Scirpus sylvaticus*), tojeść rozesłana (*Lysimachia nummularia*), trzęślica modra (*Molinia caerulea*);

[6] dzwonek okrągłolistny (*Campanula rotundifolia*), chaber nadreński (*Centaurea stoebe*), czerwiec trwały (*Scleranthus perennis*), jastrzębiec kosmaczek (*Hieracium pilosella*),

kostrzewa murawowa (*Festuca trachyphylla*), macierzanka piaskowa (*Thymus serpyllum*), szczytlika siwa (*Corynephorus canescens*);

[7] cieciora pstra (*Coronilla varia*), głóg jednoszyjkowy (*Crataegus monogyna*), koniczyna pogięta (*Trifolium medium*), pajęcznica gałęzista (*Anthericum ramosum*), przytulia właściwa (*Galium verum*), róża dzika (*Rosa canina*), rzepik wonny (*Agrimonia procera*), wyka kaszubska (*Vicia cassubica*);

[8] fiołek psi (*Viola canina*), izgrzyca przyziemna (*Danthonia decumbens*), kosmatka licznokwiatowa (*Luzula multiflora*), starzec leśny (*Senecio sylvaticus*), turzyca blada (*Carex pallescens*), turzyca pigułkowata (*Carex pilulifera*);

[9] borówka brusznica (*Vaccinium vitis-idaea*), borówka czarna (*Vaccinium myrtillus*), jałowiec pospolity (*Juniperus communis*), jastrzębiec Lachenala (*Hieracium lachenalii*), jeżyna wzniesiona (*Rubus nessensis*), kosmatka owłosiona (*Luzula pilosa*), przetacznik leśny (*Veronica officinalis*), pszeniec zwyczajny (*Melampyrum pratense*), śmiałek pogięty (*Deschampsia flexuosa*);

[10] jeżyna popielica (*Rubus caesius*), kościenica wodna (*Myosoton aquaticum*), topola biała (*Populus alba*);

[11] chmiel zwyczajny (*Humulus lupulus*), czeremcha zwyczajna (*Padus avium*), olsza czarna (*Alnus glutinosa*), wierzba rokita (*Salix rosmarinifolia*);

[12] czworolist pospolity (*Paris quadrifolia*), jesion wyniosły (*Fraxinus excelsior*), piżmaczek wiosenny (*Adoxa moschatellina*), podagrycznik pospolity (*Aegopodium podagraria*), skrzyp łąkowy (*Equisetum pratense*), trędownik bulwiasty (*Scrophularia nodosa*), wiąz szypułkowy (*Ulmus laevis*), ziarnopłon wiosenny (*Ficaria verna*);

[13] czyściec leśny (*Stachys sylvatica*), fiołek leśny (*Viola reichenbachiana*), fiołek Rivina (*Viola riviniana*), jaskier różnolistny (*Ranunculus auricomus*), kłosownica leśna (*Brachypodium sylvaticum*), perłówka zwisła (*Melica nutans*), porzeczka czerwona (*Ribes spicatum*), prosownica rozpięchła (*Milium effusum*), sałatnik leśny (*Mycelis muralis*), wietlica samicza (*Athyrium filix-femina*), zawilec gajowy (*Anemone nemorosa*), zawilec żółty (*Anemone ranunculoides*)

FAUNA

Gatunki rzadkie, zagrożone, prawnie chronione:

OWADY: ważki (Ord. Odonata), trzmiele (*Bombus* sp.), biegaczowate (Fam. Carabidae);

PAJĘCZAKI: tygrzyk paskowany (*Argiope bruennichi*);

MIĘCZAKI: ślimak winniczek (*Helix pomatia*);

PŁAZY: ropucha szara (*Bufo bufo*), taksony żab (*Rana* sp.);

GADY: zaskroniec (*Natrix natrix*), jaszczurka zwinka (*Lacerta agilis*);

PTAKI: bocian biały (*Ciconia ciconia*), bocian czarny (*Ciconia nigra*), czajka (*Vanellus vanellus*), przepiórka (*Coturnix coturnix*), jastrząb (*Accipiter gentili*), myszołów (*Buteo buteo*), puszczyk (*Strix aluco*), dzięcioły (Fam. *Picidae*), gil (*Pyrrhula pyrrhula*), brzcinka (*Locustella luscinioides*), ortolan (*Emberiza hortulana*), gąsiorek (*Lanius collurio*);

SSAKI: jeż (*Erinaceus europaeus*), kret (*Talpa europaea*), gronostaj (*Mustela erminea*), bóbr europejski (*Castor fiber*), nietoperze (Ord. *Chiroptera*).

Gatunki charakterystyczne dla środowisk występujących na analizowanym obszarze:

Wodne lub nadwodne:

OWADY: ważki (Ord. *Odonata*)

PŁAZY: ropucha szara (*Bufo bufo*), taksony żab (*Rana* sp.);

GADY: zaskroniec (*Natrix natrix*),

SSAKI: bóbr europejski (*Castor fiber*),

Tereny otwarte łąk:

OWADY: trzmiele (*Bombus* sp.);

GADY: jaszczurka zwinka (*Lacerta agilis*);

PTAKI: bocian biały (*Ciconia ciconia*), czajka (*Vanellus vanellus*), przepiórka (*Coturnix coturnix*), łożówka (*Acrocephalus palustris*), pliszka żółta (*Motacilla flava*), skowronek (*Alauda arvensis*), świergotek łąkowy (*Anthus pratensis*);

SSAKI: kret (*Talpa europaea*),

Leśne lub zadrzewień:

PTAKI: jastrząb (*Accipiter gentili*), puszczyk (*Strix aluco*), dzięcioły (Fam. *Picidae*), świergotek drzewny (*Anthus trivialis*), gąsiorek (*Lanius collurio*), cierniówka (*Sylvia communis*), kapturka (*Sylvia atricapilla*), mysikrólik (*Regulus regulus*), zniczek (*Regulus ignicapillus*);

SSAKI: jeż (*Erinaceus europaeus*), gronostaj (*Mustela erminea*).

***Rodzaje ekotopów:**

- [1] Ekotopy wodne i źródłiskowe
- [2] Torfowiska mszysto-turzycowe i mszary
- [3] Ekotopy nadwodne, okresowo zalewane
- [4] Szuwary właściwe i turzycowe
- [5] Ekotopy łąkowe
- [6] Murawy napiaskowe i kserotermiczne
- [7] Okrajki i ciepłolubne zarośla
- [8] Acydofilne wrzosowiska i poręby
- [9] Bory i acydofilne lasy liściaste
- [10] Łęgi i zarośla wierzbowe
- [11] Bagienne lasy olchowe i zarośla
- [12] Łęgi jesionowo- olchowo-wiązowe
- [13] Dąbrowy i mezofilne lasy liściaste